Gros rouge

Vass7R02s501-505



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp458

They they so they see they

Gros rouge

10 R8s-526-530

alantin/hatindiminalantind







Ā	NNEE	1991		plant w age in	and the second second							6
NOM gros Rouge					EMPLACEMENT NO Rg P 1526.530							
Souche	Nbre Débourrement nyeux début mi/déb				Ferti- Floraison lité début mi/f fin				Véraison début mi/v fin			
1	To come desirable desirabl	15,3	21.3.	4	2	29,5	26	4.6	13%	803	23.8	10,9
3 3 5	5		18.3 ×	4	Grappe Pour : Paie : Couleu Saveur	: G -(Mil Mil G - M Oh-ell Gr-Rs- m - a) Dim 1 0 - P 1 0v-0 Rg-N r - f yrène	Dim: 17 bov-cy:	Compa-	cité	: L - M-C

ANNEE 1992													
NOI	NOM gros Rouge EMPLACEMENT NO R8 1 526. 530												
Souche	yeux	début	mi/déb	grap	Ferti- lité	début	mi/f	fin	début	raison mi/v	fin	Maturité	
1	3	19.3	233-	4	. 13	18.5	21.5	26.5	17.7	22.7	257	317	
2	2	153	133	3			-1			0		4,8	
3	2	233	26.3	4	Granne	• C	6	Dim	. 12	Compa	~: + 5.	L - M (C)	
4	2	23.3	26,3	3	Pour :	_	Mil		, 10	Compa	CITE:	1 - 1 +0	
5	2	16.3	1934	1	Baie: TG - G-M- P Dim: 18								
	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus												
		23. 3.	12	,	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré								
		+3			Saveur : (s) - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène								
	Port: Mi enge Vigueur: 3,5												
							age	_		,,,			
					1								
		i											

ANNEE: 1993 gras rouge EMPLACEMENT 20 R8 4-526,530 Nbre Débourrement Mbre yeux début mi/déb grap Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité Fertiouche lité 16,3 18,3 0 200000 1 18.3 22,3× 0 2 18,3 22,3.0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C 4 18.3 22,320 Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 16,3 18.3 ~ 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Da Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANGEE: 1994. NOM gros range. EMPLACEMENT 10 R8 1 526.530

44

	M										
ouche	Mbre	mi/oeb		Ferti- lité	debut	raison mi/f	fin	début		fin	Maturité
1 2 3 4 5	62234		6 2 0 0	Crappe Pour : Baie : Couleu Saveur	2 TG - (disc- r : P- : \$)- : ave	Mil Mil Mil Sph-1 Gr-Rs- m - a	Dim 1 : () - P D 1-ov- Rg (N) r - fe	: 14) im : 20 obov-c	Compa all yl-fus : ind erb	cité	: L - M (C)

alanto degradamentalantal

N° d'ordre :

VA

Désignation : Emplacement : 10 R8 s. 526-530 (s.1). Gras range

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 jaune

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en goultière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo89

nlander landardardardardurbad

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Gros rouge 10 R8 s.526-530 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 lest volores

Ventre coloré 251 - à raies 252

Noeuds

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.) Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259,

: verte 260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Cyros ronge 10 R8 526-5300,3

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

. Calvo89

alaatan karaalaatan laatan l

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 78.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(.) Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 49 x49). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir \$1. Très pruinée 92 - pruinée 93 / non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97) - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1.) A saveur neutre 1(2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 · herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faquile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 / court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 165/- rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : coloré 133 non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 186 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 /- molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrene.

-Calvo 90

nhuntee kentuukunimi hutuul

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

*

Gras rouge 10 R80-526-530 A.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale . circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2). saillant (1) effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

N° d'ordre :
Désignation : gros rouge
Emplacement : NORBA 526,530

Angle des nervures . Sexe : 7-8-9 L_1/L : 10 - 11 : (12 - 13 - 14 - 15 - 16 L2/L Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - (27) - (28) - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (67) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - (41) Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92